ジェネリック除草剤売上No.1のサンフーロン

農林水産省登録 第18814号 除草剤



ご質問・お問い合わせはこちらまで

## 使用方法

ペトップページ > 使用方法

このページでは、サンフーロンの上手な使い方のヒントをいくつかご紹介します。

サンフーロンの上手な使い方

①雨が降りそうにない、風のない、天気の良い日に ②希釈はきれいな水を使用してください(不純物が混ざると枯らす効果が低下します) ③雑草の葉全体にムラなく散布(しっとり濡れる様に) ④雑草の種類によって薬量を変えて下さい ※他の肥料・農薬と混用しないでくだ さい。 ※土壌に落ちると速やかに不活性化するため、雑草の発生前処理効果はありません。 ※散布後2時間以内の降雨は効果を低下させる ことがあります。

1/5 sunfulon.jp/publics/index/18/

# サンフーリン 連続

2025年7月14日登録

# 雨天時の除草効果を発揮する時間が短縮!

# 散布後 2 時間後降雨でも効果(端)





〇試験:(公財)日本植物調節剤研究協会 研究所

試験草種:多年生イネ科

処理方法:薬剤の100倍希釈液(薬量:1,000ml/10a)を散布処理し、2時間後に人工的に2mmの雨を降らせた。処理26日後に観察。

### サンフ-ロンの界面活性剤は 湿展/浸透の二刀流

商品名	湿展性	浸透性
サンフーロン	0	0
ジェネリック品A	0	×
ジェネリック品B	×	0

※温展性・・・薬剤が均一に広がる性質

### 国産界面活性剤の 圧倒的な浸透力



自社でのフェルトを用いた試験結果。20℃、100倍の条件下で試験を実施。健學に浸透する までの時間ではございません。







イソプロピルアミン塩41% 農林水産省登録第18814号

大成農材株式会社 100 0120-014-052 HP:http://sunfulon.jp/



散布液の作り方

sunfulon.jp/publics/index/18/ 2/5



#### スギナを枯らしたい方



サンフーロンは頑固なスギナを 枯らすことができます。

▶詳細はこちらのページへ

#### 竹やササを枯らしたい方



サンフーロンは、枯らし方にコツの必要な竹やササを枯らすことができます。

▶ 詳細はこちらのページへ

雑草の種類別 散布時期の目安

sunfulon.jp/publics/index/18/ 3/5

#### 希釈表

倍率	サンフーロン必要量			散布できる広さ	
水量	100倍	50倍	25倍	(散布の目安です)	
1 L	1 0 m l	20m1	40ml	20m2/6坪	
4L	40ml	80ml	160ml	80m2 / 24坪	
5 L	50ml	100ml	200ml	100m2/30坪	
1 O L	100ml	200ml	400ml	200m2/60坪	
20L	200ml	400ml	800m l	400m2/120坪	
50L	500ml	1 L	2L	1,000m2 / 300坪	
100L	1 L	2L	4 L	2,000m2 / 600坪	

安全使用上の注意

#### 眼に入らないよう注意

眼に入った場合はただちに十分に水で洗い流し、眼科医の手当てを受けてください。薬液を調整する際、つる処理をする際は保護眼鏡を着用してください。

#### 皮ふに付着しないよう注意

付着した場合には、ただちに石けんでよく洗い落としてください。 使用時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業着などを着用する。作業後は、手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

#### 魚毒性

水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。養魚田周辺での使用には、特に注意してください。

#### 周囲への配慮

公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

#### 保管

使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。 保管は密封し、直射日光を避け、冷涼な場所にて保存ください。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader のインストールが必要です。 詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。

sunfulon.jp/publics/index/18/
4/5